


Superkrálík - Noviny

Díl 1. Únor 2015



Mlád'ata

Dne 4. a 9. Února se Super králíkovi narodila nová mlád'ata. Zatím není jasno kolik jich je. Ale doufá se, že jich bude hodně.



Kokcidióza

Kokcidióza králíků je parazitární onemocnění trávicího ústrojí. Původcem jsou mikroskopičtí, jednobuněční parazité-kokcidie (rodu Eimeria). Všechny Eimerie parazitují ve střevech, až na jeden druh (E.stiedai), který parazituje v králíčích játrech. Tyto kokcidie jsou jednohostitelské, onemocnění postihuje tedy pouze králíky, není přenosné na jiné druhy zvířat ani na člověka.

Vtipy

"Na obrázku vidíš vedle sebe králíka a zajíce. Jirko, řekni nám, který z nich je králík?"

"To je ten vedle zajíce."

"Dobře, a který je zajíc?"

"Přece ten vedle králíka."

Vlkovi se narodil syn. Když mu ho v porodnici ukazovali, vlk se přímo rozplýval: "To je krásné děťátko, ta očka, to jsem celý já! A ten čumáček taky!

A ty uši... ty uši... TY UŠI!!! Jen počkej, ZAJÍCI !!!



Beran

Hmotnost zakrslého berana by měla být mezi 1,5 kg až 2 kg. Tělo berana je spíše kratší, zavalité. Krk je neznatelný a má kratší tlapy. Hlava má být kulatá, s výraznými skráněmi. Typické pro berany jsou jejich uši. Jsou svisle k zemi a při pohledu zepředu mají tvořit jakoby podkovu. Na konci uší mají být znatelné hrbolky, nazývají se korunky. Co se týče barevných rázů, tak u zakrslých beranů najdeme snad všechny existující barevné kombinace. Potrava zakrslého berana je seno a granule. Má až 4 mlád'ata na 1 porod.

Co to znamená

Prskání- Králík je agresivní

Vrkání- Králíci jsou spokojeni, cítí jistotu

Dupání- Králík se bojí nebo vyhrožuje



Hrabání- Králík si přeje více vaší pozornosti

Pronikavé ječení- Silná bolest.

Slabé mletí čelistí- králíkovi se to nelíbí

Zajímavosti

Největší králík váží 12 kg

Zakrslí králíci značkují předměty podle pachové žlázy

Když králíci vycítí nebezpečí, stáhnou se k zemi a stáhnou uši

Rozmnožování

Králík domácí je zvířetem, které má, podobně jako jeho divoký předek, schopnost velmi rychle se rozmnožovat. Pohlavně dospívá už ve 3 nebo 4 měsících věku, i když chovatelská dospělost nastává až v osmém měsíci věku. *Ramlíce*, samice králíka, mají nepravidelnou říji, která se opakuje vždy asi po třech týdnech a to hlavně od února do září.

Králík má tzv. provokovanou ovulaci, to znamená, že k vyplavení vajíček dojde až při dráždění pochvy samcem. To zvyšuje šanci vajíček na oplození. Březost pak trvá 28 až 35 dní. Čím je méně králíčků tím déle trvá březost.

Březí samice si připravuje hnízdo pro vrh mláďat. Toto chování se objevuje i u králic, které sice byly připuštěny, ale nezabřezly - pak se jedná o březost falešnou.

V jednom vrhu bývá 6 až 11 mláďat, přesný počet závisí na plemeni. Porodní hmotnost se pohybuje kolem 60 g, králíčata jsou holá, slepá a zcela závislá na své matce. Králice kojí jen jednou denně, její mléko je ale velmi vydatné.

Mladí králíci otvírají oči 9 nebo 10 den a do 20. dne opouštějí hnízdo. Odstavují se do 54.dne od narození.

Zajímavost: Pokud samice příliš ztloustne, přichází přechodně o schopnost mít mláďata. Zhubnutí, které vede k obnovení možnosti březosti, se dosáhne tak, že tlustá samice přejde na dietu, např. v drobnochovech se této samici dává jen voda a seno.